

FERME DE CORIOULE

Composition du troupeau :

- ✓ < 6 mois : 22 femelles et 22 mâles
- ✓ 6-12 mois : 9 femelles et 7 mâles
- ✓ 1-2 ans : 27 femelles et 20 mâles
- ✓ +2 ans : 80 femelles et 3 mâles
- **Objectif de 70 vêlages.**



Surface fourragère :

- ✓ 45 ha prairies permanentes (10 ha de fauche, 10 ha une coupe puis pâturage, 25 ha pâturage)
- ✓ 3.5 ha maïs (ensilage ou épis broyé)
- ✓ 5 ha méteil ensilé (triticale, avoine, pois fourrager, vesce commune d'hiver) suivi de trèfle d'Alexandrie ensilé (1 coupe puis repousse comme engrais vert)
- ✓ 5 ha ray-grass Anglais et hybride, trèfle violet, trèfle blanc, fléole, dactyle, fétuque élevée
- ✓ 7 ha luzerne, trèfle blanc, dactyle

ÉLEVAGE

Période de vêlage :

- ✓ Septembre à novembre (pour l'organisation de travail)
- ✓ Sevrage vers 6 mois, avant la mise en prairie
 - les vaches à distance
 - les veaux à proximité du bâtiment pour les complémenter

Alimentation :

- ✓ Vaches : 2/3 ensilage d'herbe + 1/3 méteil + son (de la ferme)
- ✓ Veaux < 6 mois : idem vaches + foin + un complément 2/3 épeautre-1/3 féverole
- ✓ Jeune bétail (6-14 mois) : prairie + foin + un complément 2/3 épeautre-1/3 féverole

ENGRAISSEMENT

- Ensilage herbe première coupe
- Ensilage trèfle d'Alexandrie
- Ensilage maïs
- Foin (+ paille)
- Epeautre
- Féverole
- Son (de la ferme)

